


## **Уважаемые граждане и организации!**

### **Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области**

#### **ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!**

### **О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ**



**Африканская чума свиней (АЧС)** — инфекционная болезнь свиней и кабанов.

#### **ЛЕЧЕНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ НЕ РАЗРАБОТАНЫ!!!**

В качестве главного фактора риска заноса африканской чумы свиней на территории Республики Мордовия и Пензенской области следует рассматривать нелегальный ввоз инфицированных свиней и продуктов их убоя (мясо, мясопродукты), контактирование домашних свиней с дикими кабанями.

Риску заноса возбудителя африканской чумы свиней подвержены в первую очередь свиноводческие фермы, не работающие в режиме «предприятия закрытого типа»; свиноводческие хозяйства, расположенные вблизи лесных массивов, железнодорожных, автомобильных дорог; подсобные хозяйства и личные подворья граждан, использующие для кормления свиней пищевые отходы без термической обработки.

#### **ЧТОБЫ АЧС НЕ РАЗОРИЛА ВАШЕ ПОДВОРЬЕ, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВИНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**

Не используйте на корм свиньям пищевые отходы. Покупайте корма только промышленного производства. Будьте особенно осторожны с пищевыми отходами из столовых школ, детских садов, больниц, а также рынков, воинских частей и исправительных колоний УФСИН России, предприятий и организаций.

Содержите свиней без выгула, т.е. в режиме безвыгульного содержания, запретите посторонним доступ в свое хозяйство.

Проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами.

Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без предварительного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами ветеринарной службы.

Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой субъектов.

Обязательно предоставляйте поголовье свиней для осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами.

Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог. Не пытайтесь продать или переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней, это может привести к дальнейшему распространению болезни.

**ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АЧС:** убой и уничтожение не только больных свиней, но и всего их поголовья, продуктов свиноводства.

Серьезные ограничения деятельности сельскохозяйственных предприятий и владельцев личных подсобных хозяйств и другие жесткие меры – единственный действенный способ борьбы с АЧС!

**ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕЖА СВИНЕЙ НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ** в государственные ветеринарные учреждения по регионам обслуживания, в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефонам «горячей линии»:

в г. Саранск – (8342) 23-19-98, 24-12-10 (с 8:30 до 17:30), 8-927-978-76-02 (круглосуточно);

в г. Пенза – (8412) 62-97-57 (с 8:30 до 17:30); 8-927-371-07-58 (круглосуточно).

# Африканская чума свиней: причины и последствия

Африканская чума свиней — легко передающаяся вирусная болезнь свиней, не представляющая опасности для человека, но наносящая огромный экономический ущерб сельскому хозяйству

## Возбудитель



Вирус семейства *Asfarviridae*,  
рода *Asfivirus*



Может сохраняться на протяжении нескольких месяцев в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке



Устойчив к влиянию окружающей среды

## Пути передачи инфекции



Выделения больных животных



Использование в корм необезвреженных столовых отходов



Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, кожные паразиты

## Течение болезни



При молниеносном течении болезни животные гибнут без каких-либо признаков

При остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы ▼

Больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются и быстро устают

Серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз

Появляется сильная жажда

Одышка

Кашель

Приступы рвоты

Повышенная температура тела —  
до 40,5–42,0 °C

На нежных участках кожи могут появиться гнойные волдыри, на месте которых образуются струпа и язвы

На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют

У больных животных раскручивается хвост

Иногда понос с кровью, чаще запор

Слабость и параличи задних конечностей, шаткая походка



Смертность, в зависимости от течения, может достигать **от 50 до 100%**. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями

## Профилактика



Не допускать свободного выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне



Ежедневно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых, постоянно вести борьбу с грызунами



Не использовать необезвреженные корма животного происхождения



Ограничить связи с неблагополучными территориями

## Борьба



Поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируют **бескровным способом**



Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода **сжигают**. Зола закапывают в ямы, смешивая ее с известью



Помещения и территории ферм **дезинфицируют** горячим 3% раствором едкого натрия и 2% раствором формальдегида



На расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта **все свиноголовье убивают**, а мясо **перерабатывают на консервы**



Карантин **снимают через 6 месяцев** с момента последнего случая падежа, а разведение свиней разрешают **не ранее, чем через год** после снятия карантина